

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению сыворотки «Витафел-С»  
для профилактики и лечения панлейкопении, инфекционного ринотрахеита,  
калицивироза и хламидиоза кошек

(организация-разработчик: ООО «ЛеВита ПЛЮС»,  
123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 25, корп.1)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сыворотка «Витафел-С» (Serum «Vitafel-S»).

Международное непатентованное наименование: Сыворотка для профилактики и лечения панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза кошек.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

«Витафел-С» - сыворотка крови животных-доноров (кошек), иммунизированных антигенами возбудителей панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза кошек. Сыворотка содержит антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита кошек (РН) в титре не ниже -  $4,5 \log_2$ , калицивирусу кошек (РН) не ниже -  $5,5 \log_2$ , вирусу панлейкопении кошек (РТГА) не ниже -  $6,0 \log_2$  и хламидиозу кошек (РСК) не ниже - 1:10.

3. По внешнему виду сыворотка представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого или желто-коричневого цвета. При хранении допускается образование незначительного осадка, легко разбивающегося при взбалтывании.

Срок годности сыворотки «Витафел-С» 2 года с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности препарат к применению не пригоден.

4. Сыворотка расфасована по 1,0 мл (1 доза) в стеклянные ампулы (флаконы) соответствующей вместимости. Ампулы герметично запаяны, флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленные алюминиевыми колпачками. Ампулы (флаконы) с сывороткой упакованы в блистеры (коробки) по 10 штук.

В каждую коробку (блистер) с препаратом вложена инструкция по применению.

5. Сыворотку хранят и транспортируют в закрытом, защищенном от света месте в упаковке производителя при температуре от 2°C до 8°C.

6. Сыворотку следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Ампулы (флаконы) с препаратом без этикеток, с истёкшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с изменённым цветом и/или консистенцией содержимого, наличием посторонних примесей, а также остатки

сыворотки, не использованные в день вскрытия флаконов (ампул), подлежат выбраковке и обеззараживанию путём кипячения в течение 30 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Биологические свойства

9. Сыворотка «Витафел-С» - иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Сыворотка «Витафел-С» представляет собой гомологичную сыворотку крови животных-доноров (кошек), содержащую антитела к возбудителям панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса и хламидиоза кошек, которые при введении в организм вызывают формирование специфического иммунного ответа.

Пассивный иммунитет у кошек после введения с профилактической целью сыворотки «Витафел-С» сохраняется не менее 2 недель.

Препарат обладает лечебными свойствами, максимально проявляющимися в инкубационном и продромальном периодах инфекционного процесса. Наибольший терапевтический эффект достигается при использовании препарата в начальной стадии болезни.

## III. Порядок применения

11. «Витафел-С» применяют для профилактики и лечения панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса и хламидиоза животных семейства кошачьих.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к сыворотке.

13. Сыворотку вводят подкожно, соблюдая правила асептики и антисептики.

Для профилактики указанных вирусных болезней животным вводят 1,0 мл (1 дозу) сыворотки однократно или двукратно с суточным интервалом. По истечении срока формирования пассивного иммунитета (2 недели) для создания активного иммунитета проводят вакцинацию.

С лечебной целью «Витафел-С» вводят в указанной дозе трёхкратно с интервалом 12-24 часа, в зависимости от тяжести состояния животного. Наибольший терапевтический эффект достигается при использовании препарата в начальной стадии болезни.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не установлено.

16. Сыворотка «Витафел-С» может быть назначена животному, независимо от его возраста и физиологического состояния (беременность, лактация и др.). Она не вызывает побочных реакций даже у породистых и изнеженных кошек. Предпочтительно введение препарата не новорожденным котёнкам, а окотившимся кошкам в первые сутки после окота. Это обеспечивает высокое содержание антител в молозиве.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных действий и осложнений не отмечается. При использовании препарата для особо чувствительных животных с целью профилактики возникновения анафилактики рекомендуется дробное введение: вначале 0,25 мл, а затем, через 30-60 минут – оставшуюся дозу препарата.

19. Допускается применение сыворотки «Витафел-С» одновременно с витаминами, антибиотиками, пробиотиками и другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения.

Сыворотку «Витафел-С» запрещено применять в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

20. Сыворотка «Витафел-С» не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с сывороткой «Витафел-С» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении профилактических и лечебных мероприятий, должны быть обеспечены спецодеждой (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки и др.) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы).

В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании сыворотки на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо тщательно промыть большим количеством водопроводной воды. При случайной инъекции глобулина человеку необходимо место введения обработать 70% раствором этилового спирта и обратиться в медицинское учреждение.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению сыворотки «Витафел-С», утвержденная Россельхознадзором 15 августа 2012 г.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, 600014, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «ЛеВита ПЛЮС», 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 25, корп.1

Номер регистрационного удостоверения

44 - 1 - 16.17 - 3965 N173P - 1 - 1.9 / 00000