

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-кокцида для лечения и профилактики кокцидиоза у молодняка крупного и мелкого рогатого скота, свиней и собак (организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 117437, г. Москва, ул. Ак. Арцимовича, д. 3, корп. 1, кв. 222)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стоп-кокцид (Stop-coccid).

Международное непатентованное наименование: толтразурил.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Стоп-кокцид в 1 мл в качестве действующего вещества (ДВ) содержит толтразурил - 50 мг, а также вспомогательные вещества: бензоат натрия, карбоксиметилцеллюлозу, цикламат, сахарин, аспартам, лактозу, полипропиленгликоль, твин-80, аэросил и воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой суспензию белого цвета; при хранении допускается расслоение, исчезающее при встряхивании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства.

Запрещается применение Стоп-кокцида по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 250, 500 мл и 1 л в полимерные флаконы, а также по 5 л в полимерные канистры с навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон объемом до 250 мл упаковывают поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению. Флаконы и канистры объемом свыше 250 мл помещают в транспортную тару в комплекте с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

6. Стоп-кокцид следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стоп-кокцид относится к антикокцидийным препаратам группы триазинтриона.

10. Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на стадиях внутриклеточного развития паразитов, эффективен в отношении всех видов кокцидий, включая *Eimeria* spp., *Isospora* spp., *Cystoisospora* spp., паразитирующих у поросят, телят, ягнят и щенков собак.

Толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов, блокируя дыхательные ферменты, вызывает гибель паразитов.

После перорального введения лекарственного препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта.

В организме толтразурил метаболизируется путем сульфоокисления и гидроксирования, с образованием сульфоксида и сульфона. Выводится из организма в основном в неизменном виде – до 70%, а также в виде метаболитов с фекалиями и частично с мочой.

Стоп-кокцид по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у животных побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

III. Порядок применения

11. Стоп-кокцид назначают телятам, ягнятам, козлятам, поросятам и щенкам собак для лечения и профилактики кокцидиозов.

12. Противопоказанием к применению Стоп-кокцида является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, серьезные нарушения функции печени и/или почек.

Не следует применять препарат крупному рогатому скоту старше 9-месячного возраста.

13. Стоп-кокцид применяют животным перорально индивидуально с помощью шприца-дозатора. В случае появления осадка емкость с суспензией перед использованием следует тщательно встряхнуть.

Дозы и схемы применения препарата представлены в таблице.

Таблица

Вид животного	Возраст	Доза лекарственного препарата на 1 кг массы животного		Кратность и длительность применения препарата
		ДВ, мг/кг	суспензии, мл/кг	
Телята, ягнята и козлята	с 14 дней	15	0,3	однократно
Поросята	с 3 дней	20	0,4 (не менее 0,5 и не более 2 мл/животное)	однократно
Щенки собак	с 14 дней	10	0,2	1 раз в день, 3 дня подряд

В неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах для достижения максимального профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, препарат следует назначать животным до появления в стаде первых клинических признаков заболевания.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды, расстройство желудочно-кишечного тракта.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Стоп-кокцид не предназначен для применения беременным и лактирующим самкам.

17. Несоблюдение рекомендуемого интервала при применении Стоп-кокцида щенкам может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной дозы препарата его следует ввести как можно скорее.

18. При применении Стоп-кокцида в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной

индивидуальной чувствительности к препарату и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Стоп-кокцид не следует применять одновременно с другими антикокцидийными средствами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других групп и кормовыми добавками отсутствуют.

20. Убой телят, ягнят и козлят на мясо разрешается не ранее чем через 63 суток, поросят – не ранее чем через 70 суток после применения Стоп-кокцида. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе со Стоп-кокцидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта со Стоп-кокцидом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, Балашихинский район, Полтевское шоссе, владение 4.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Стоп-кокцида, утвержденная Россельхознадзором от 31 августа 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2112-0966 № ПВР-3-2112/02859