

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Мази ихтиоловой 10% для лечения ран, ожогов, экзем, дерматитов и
Мази ихтиоловой 20% для лечения фурункулеза, пиодермии, заболеваний копыт и
копытец у животных

(организация-разработчик: ООО «СПАЗ-фарм», Саратовская обл., г. Пугачев)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь ихтиоловая 10% и 20% (Unguentum Ichtyoli 10%, 20%).

Международное непатентованное наименование: ихтаммол.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь ихтиоловая 10% содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол – 10 г, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин до 100 г.

Мазь ихтиоловая 20% содержит в 100 г в качестве действующего вещества ихтиол – 20 г, а в качестве вспомогательного вещества – вазелин до 100 г.

3. Выпускают Мазь ихтиоловую 10% и 20% расфасованную по 50, 100, 200, 250, 400, 500, 750, 800 г и 1,0 кг в полимерных банках с герметично закрывающимися крышками и 20,0 кг в полимерных бочках с герметично закрывающимися крышками. Каждая единица упаковки сопровождается инструкцией по применению.

4. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 10°C до 25°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.

Запрещается использовать препарат после истечения срока его годности.

5. Мазь ихтиоловую 10% и 20% следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Мазь ихтиоловая 10% и 20% относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи.

Ихтиол оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. При нанесении на раны суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной ткани.

По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10% и 20% относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют животным (кроме кошек) при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты), Мазь ихтиоловую 20% - при фурункулезе, пиодермии, заболеваниях копыт и копытец.

9. Противопоказанием к применению Мази ихтиоловой 10% и 20% является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.
10. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют наружно 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней, нанося ее ровным слоем на пораженную поверхность.
11. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата у животных не выявлены.
12. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при отмене не установлено.
13. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препарата его следует нанести как можно быстрее.
14. Мазь ихтиоловая 10% и 20% не вызывает у животных побочных действий и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.
15. Мазь ихтиоловую 10% и 20% не назначают одновременно с другими лекарственными препаратами наружного применения.
16. Продукцию животноводства, полученную во время и после применения Мази ихтиоловой 10% и 20%, можно использовать для пищевых целей без ограничения.

III. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с Мазью ихтиоловой 10% и 20% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.
18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10% и 20%. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).
19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.
20. Организация-производитель: ООО «СПАЗ-фарм», 413712, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 2, тел./факс: +7(84574)2-70-49.

Инструкция разработана ООО «СПАЗ-фарм», 413712, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 2, тел./факс: +7(84574)2-70-49.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция, утвержденная Россельхознадзором 21 сентября 2009 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения:

