

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Каниквантела Плюс для дегельминтизации собак и кошек.

(Организация-разработчик: фирма «Евракон Фарма ГмбХ», Макс-Планк-стр. 11-Д 86
Унтершлейбхем, Германия /«Euracon Pharma GmbH»,
Max-Planck-Str. 11- D 86, Unterschleißheim, Germany.)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Каниквантел Плюс (Caniquantel Plus).

Международное непатентованное наименование: фенбендазол, празиквантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

В качестве действующих веществ в 1 таблетке Каниквантела Плюс содержится 500 мг фенбендазола и 50 мг празиквантела, а также вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат – 10 мг, поливидон – 20 мг, ароматизатор со вкусом мяса – 12 мг, магнезии стеарат – до 0,6 г.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой плоскую круглой формы таблетку, белого цвета с двумя пересекающимися рисками с одной стороны, массой 0,6 г.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 4 года со дня производства.

Лекарственный препарат запрещается применять по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 3 или 12 таблеток в блистерах из ламинированной бумаги, упакованные в картонные коробки по 6 или 24 таблетки и по 120 таблеток – в металлические коробки. Каждая единица потребительской упаковки снабжена инструкцией по применению.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Каниквантел Плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Каниквантел Плюс относится к комплексным антигельминтным препаратам.

10. Обладает широким спектром антигельминтного действия на все стадии развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в т.ч., *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multicoloris*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp.

Механизм действия празиквантела, входящего в состав Каниквантела Плюс, заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении

транспорта глюкозы и микротурбулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита.

Механизм действия фенбендазола, входящего в состав лекарственного препарата, основан на ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

При пероральном введении лекарственного препарата празиквантел и фенбендазол всасываются в желудочно-кишечном тракте и распределяются в органах и тканях животного; выводятся из организма в основном с мочой.

Каниквантела Плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Каниквантел Плюс назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестодоз).

12. Запрещается применять лекарственный препарат щенкам и котятм моложе 3-недельного возраста.

13. Перед применением Каниквантела Плюс предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

Препарат применяют животным перорально индивидуально из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного однократно в утреннее кормление.

В случае отказа животного от корма с антигельминтиком препарат вводят принудительно на корень языка или в виде водной суспензии.

Для приготовления водной суспензии таблетку Каниквантела Плюс измельчают, суспендируют в 10 мл воды, интенсивно взбалтывают и тотчас вводят животному при помощи шприца с катетером из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

С профилактической целью животных дегельминтизируют ежеквартально в терапевтической дозе.

14. При передозировке препаратом может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, диарея и рвота. В этом случае проводят симптоматическую терапию.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

16. Каниквантел Плюс не следует применять кормящим и беременным самкам в первые две трети беременности и кормящим самкам в течение первых трех недель после родов.

17. Лекарственный препарат применяют однократно.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Каниквантела Плюс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств.

19. Не рекомендуется применять Каниквантел Плюс с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможного снижения эффективности.

20. Каниквантел Плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Каниквантел Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каниквантел Плюс.

23. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

«Евракон Фарма ГмбХ», Макс-Планк-стр.
11-Д 86 Унтершлейбхем, Германия /
«Euracon Pharma GmbH »,
Max-Planck-Str. 11- D 86,
Unterschleibheim, Germany.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

«Евракон Фарма ГмбХ», Макс-Планк-
стр. 11-Д 86 Унтершлейбхем,
Германия / «Euracon Pharma GmbH »,
Max-Planck-Str. 11- D 86,
Unterschleibheim, Germany.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Каниквантел Плюс, утвержденная Россельхознадзором 04 октября 2013 года.

Номер регистрационного удостоверения 276-3-36.13-1815 № ПВИ-3-0.2/01208