

17 ФЕВ 2023

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль

(организация-разработчик: ООО «БИОСТИМ», Россия, 397705, Воронежская обл.,
Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д. 5, оф. 1)

Номер регистрационного удостоверения: 10-3-3.23-4968/ПВР-3-383/03795

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
- торговое наименование: АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль
(ANTISEPTIC-STIMULATOR D-3 fraction Aerosol);

Международное непатентованное наименование: отсутствует.

2. Лекарственная форма: аэрозоль для наружного применения.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль содержит в 1 мл в качестве действующего вещества фармацевтическую субстанцию АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция, (продукт сухой возгонки мясокостной муки, содержащий карбоновые кислоты, алифатические и циклические углеводороды, замещенные фенолы, алкилбензолы, алифатические амины, амиды, аминокислоты, соединения с активной сульфгидрильной группой, воду) – 0,7 мл, в качестве пропеллента: пропан-бутан – 0,3 мл.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Срок годности лекарственного препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 4 года с даты производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль выпускают расфасованным по 100, 150, 200, 250, 300 мл в алюминиевые или жестяные моноблочные аэрозольные баллоны с инертным газом под давлением с клапанами и головками для распыления, снабженными пластмассовыми колпачками. Каждый баллон снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 2 °С до 30 °С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: биогенные стимуляторы.

10. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав лекарственного препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, стимулирует активность ретикуло-эндотелиальной системы, нормализует трофические процессы и ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль назначают КРС и свиньям для лечения дерматитов, хронических воспалительных повреждений кожи и копыт, трофических язв, некробактериоза, а также для обработки ран травматического происхождения, ссадин и царапин.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу.

По окончании работы следует вымыть с мылом лицо и руки.

Людам с гиперчувствительностью к препарату следует избегать прямого контакта с препаратом

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Пустые баллоны из-под препарата запрещается разбирать и сжигать, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Исследование безопасности применения препарата беременным, лактирующим и новорожденным животным не проводилось. Возможность применения препарата данным группам животных определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы к возможному риску его применения.

15. Препарат АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль применяют наружно на поврежденные участки кожи.

Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть.

При экземах, пролежнях, хронических воспалительных поражениях кожи и трофических язвах на пораженные участки кожи наносят аэрозоль 1 раз в сутки, с захватом 2-3 см здоровой кожи (с целью предупреждения распространения очага воспаления).

Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 14 суток

При обширных поражениях аэрозоль наносят попеременно на разные участки, покрывая за одну обработку не более 1/10 поверхности тела животного.

При некробактериозе и копытной гнили КРС после соответствующей очистки и обработки пораженных участков конечностей их орошают препаратом АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль один раз в сутки. Лечение проводят в комплексе с местными хирургическими обработками и лекарственными средствами специфической и симптоматической терапии до выздоровления животного, но не более 14 суток.

Для обработки ран при кастрации и купировании хвостов у поросят, телят, мечении выщипами, бирковании препарат наносят на рану сразу после операции однократно, при необходимости обработку повторяют через 72 часа.

При каннибализме свиней аэрозоль наносят на поврежденную поверхность кожи один раз в сутки до выздоровления животного, но не более 14 суток.

До начала применения препарат должен быть выдержан при температуре 15-25⁰С не менее 5-6 часов.

Перед применением баллон тщательно встряхивают и, нажимая на распылительную головку, распыляют препарат на пораженный участок с расстояния 15-20 см в течение 2-3 секунд.

Обработку животных следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к лекарственному препарату и возникновении аллергических реакций, использование препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-3 фракция Аэрозоль в соответствии с инструкцией не выявлены.

18. Сведения о несовместимости лекарственного препарата с различными группами лекарственных средств отсутствуют.

19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата Антисептик-Стимулятор Д-3 фракция аэрозоль, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата Антисептик-Стимулятор Д-3 фракция Аэрозоль используются в пищевых целях без ограничений.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. ООО «БИОСТИМ», Воронежская обл., Бобровский р-н, юго-западная часть кадастрового квартала 36:02:5400027.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «БИОСТИМ», 397705, Воронежская обл., Бобровский р-н, г. Бобров, станция Битюг, д.5, оф.1.
Тел.: +7(906) 580-02-90
e-mail: biostim.bobrov@mail.ru

Директор ООО «БИОСТИМ»



Н.Н. Куконин