

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тетравита (комплекса витаминов А, D₃, Е, F в масле) для профилактики и лечения гиповитаминозов у животных, повышения выносливости в стрессовых ситуациях

(организация-разработчик: ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, г. Саратов, ул. им. Осипова, В.И., дом 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) (Tetravit (complex of vitamins A, D₃, E, F in oil)).

Международное непатентованное наименование: витамин А, витамин D₃, витамин Е, витамин F.

2. Лекарственная форма –раствор для инъекций и орального применения.

В 1 мл лекарственного препарата содержится в качестве действующих веществ: витамина А (ретинола пальмитата(ацетата)) - 50000 МЕ, витамина D₃ (холекальциферола) - 25000 МЕ, витамина Е (токоферола ацетата) - 20 мг, витамина F - 5 мг и вспомогательные компоненты: масло растительное подсолнечное или масло из плодовых косточек и орехов миндаля, или масло соевое, или масло оливковое – до 1 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную, маслянистую жидкость светло-желтого цвета. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 28 суток.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) выпускают расфасованным по 20, 50 и 100 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°С до 25°С.

6. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) восполняет недостаточность витаминов в организме животных.

10. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы витамина А в организме животного препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ.

Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием.

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃.

Витамин F представляет собой смесь незаменимых омега-3 омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. В организме принимает участие в синтезе жиров (особенно насыщенных), метаболизме холестерина, обладает противовоспалительным и антигистаминным эффектом, стимулирует иммунную защиту организма и заживление ран. В комплексе с витамином D₃ способствует ассимиляции кальция и фосфора, что является необходимым для костной ткани.

Введение лекарственного препарата в организм приводит к быстрому возрастанию концентрации витаминов в крови и накоплению их в печени и других тканях.

Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов; повышения выносливости в стрессовых ситуациях; когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок: во время беременности (только во второй половине); в период лактации, при нарушениях воспроизводительной функции; при транспортировке животных; при замене рациона; при задержке роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных заболеваниях (в качестве вспомогательного средства); при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или травм.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является гипервитаминоз и сверхчувствительность к составным частям лекарственного средства.

13. Препарат вводят внутримышечно, подкожно или орально животным в следующих дозах (на животное в сутки):

| Вид животного | Доза, мл | Вид животного | Доза, мл |
|----------------------|----------|------------------------|----------|
| Крупный рогатый скот | 5,0-6,0 | Поросята-отъемыши | 1,5 |
| Лошади | 3,0-5,0 | Ремонтный молодняк | 2,0 |
| Телята, жеребята | 2,0-3,0 | Поросята-сосуны | 1,0 |
| Овцы, козы | 1,0-2,0 | Новорожденные поросята | 0,5 |
| Ягнята | 1,0 | Собаки | 0,2-1,0 |
| Свиньи | 3,0-5,0 | Кролики | 0,2 |

С профилактической целью препарат вводят животным один раз в 2-3 недели, с лечебной целью - один раз в 7-10 дней.

При оральном введении препарат дают животным в смеси с кормом в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

14. При передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться: нарушение координации движений, саливация, угнетение. Применяют симптоматические средства и меры, направленные на ускоренное выведение Тетравита (комплекса витаминов А, D₃, Е, F в масле) из организма.

15. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

16. Применение Тетравита (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) беременным животным возможно только во 2 половине, лактирующим и потомству животных под контролем ветеринарного врача. Супоросным свиноматкам лекарственный препарат вводят за 3-4 недели до опороса, сухостойным коровам за 1-1,5 месяца до отела.

17. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата применение осуществляется по той же схеме в соответствии с настоящей инструкцией. Не следует вводить двойную дозу для компенсации пропущенной.

18. При применении в рекомендуемых дозах в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности у некоторых животных наблюдается возбуждение, саливация, атаксия, учащенная дефекация и мочеиспускание. В этих случаях применение препарата прекращают, вводят антигистаминные препараты, проводят симптоматическую и дезинтоксикационную терапию.

19. Лекарственный препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение Тетравита (комплекса витаминов А, D₃, Е, F в масле) с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск проявления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивают риск развития внутричерепной гипертензии.

С осторожностью применяют при одновременном назначении с НПВС, сердечными гликозидами, так как препарат усиливает их действие.

При оральном применении ацетилсалициловая кислота и масляные слабительные средства ухудшают всасывание витаминов.

Избегать контакта лекарственного препарата с дезинфектантами.

20. Продукцию от животных, которым применяли Тетравит (комплекс витаминов А, D₃, Е, F в масле) можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Тетравитом (комплексом витаминов А, D₃, Е, F в масле) следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тетравитом (комплексом витаминов А, D₃, Е, F в масле). При работе с Тетравитом (комплексом витаминов А, D₃, Е, F в масле) запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. Пустые флаконы и бутылки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством водопроводной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Тетравита (комплекса витаминов А, D₃, Е, F в масле), утвержденная Россельхознадзором 07 июня 2013 года.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д.1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «НИТА-ФАРМ»; 410010, г. Саратов ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-13.13-3020 нПВР-3-4.0/00453