

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Адвантейдж® для лечения и профилактики энтомозов  
у собак и кошек

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»  
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Адвантейдж® (Advantage®).

Международное непатентованное наименование: имидаклоприд.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Адвантейдж® в 1 мл в качестве действующего вещества содержит имидаклоприд — 100 мг, а также вспомогательные вещества: бензиловый спирт, пропилен карбонат и бутилгидрокситолуол.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения — 5 лет со дня производства.

Запрещается применение препарата Адвантейдж® по истечении срока годности.

4. Адвантейдж® выпускают в форме раствора (spot-on), расфасованным по 0,4; 0,8; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, упакованные по 1 и 3 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Адвантейдж® следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Адвантейдж® относится к инсектицидным препаратам группы хлороникотиниловых инсектицидов.
10. Имидаклоприд {1-(6-хлор-3-пиредилметил)-N-нитро-имидазолидин-2}, входящий в состав препарата, обладает выраженным инсектицидным и ларвицидным действием на блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия имидаклоприда основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что вызывает гибель насекомых.

После нанесения препарата на кожу имидаклоприд постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах животного, оказывая длительное (до 4-х недель) контактное инсектицидное действие.

Адвантейдж® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсибилизирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

## III. Порядок применения

11. Адвантейдж® применяют для уничтожения насекомых (блох, вшей, власоедов), паразитирующих на собаках и кошках.
12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Адвантейдж® запрещается применять котятам моложе 10-недельного возраста и щенкам моложе 8-недельного возраста.
13. Адвантейдж® применяют животным однократно путем капельного («spot-on») нанесения на сухую, неповрежденную кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок с обратной

стороны), затем колпачок снова снимают и, раздвинув шерсть, наносят препарат животному, выдавливая из пипетки, на кожу в места, недоступные для слизывания (собакам между лопатками у основания шеи, кошкам — на затылке).

В зависимости от вида и массы животного используют Адвантейдж® различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Вид и масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза имидаклоприда, мг/кг массы животного
<b>Собаки:</b>		
до 4 кг	0,4	10
4 - 10 кг	1,0	10 - 25
10 - 25 кг	2,5	10 - 25
25 - 40 кг	4,0	10 - 16
<b>Кошки:</b>		
до 4 кг	0,4	10
4 - 8 кг	0,8	10 - 20

При обработке собак массой более 40 кг и кошек массой более 8 кг используют комбинации пипеток различной фасовки из расчета 0,1 мл/кг.

При обработке крупных собак содержимое пипетки наносят на кожу в три-четыре места от лопаток до основания хвоста.

Гибель паразитирующих на животном насекомых происходит в течение 12 часов. Защитное действие препарата после однократной обработки животного продолжается до 4 недель. Повторные обработки животных на протяжении сезона активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в 28 дней.

При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии.

14. При передозировке препарата у некоторых животных может наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

16. Обработку беременных и кормящих самок при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения препарата у животных возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1-4 дней и не требуют применения лекарственных средств. Слизывание препарата может вызвать повышенную саливацию у животного, так как препарат имеет горький вкус, что не является признаком отравления и самопроизвольно проходит через несколько минут. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

19. Не следует применять Адвантейдж® одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

20. Адвантейдж® не предназначен для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Адвантейдж® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям (пока место нанесения препарата не станет сухим) в течение 24 часов после обработки.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Адвантейдж®. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Bayer Animal Health GmbH» KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО “БАЙЕР”  
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,  
18, стр. 2;  
тел. (495) 234-2000

Номер регистрационного удостоверения 276-3-6.14-2123 N17ВЧ-3-0.2101184

С утверждением (согласованием) настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Адвантейдж®, утвержденную Россельхознадзором 30.07. 2014 года.