

VET DIET - GASTRO

Оценка общего состояния животных

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
Температура	Повышенная	4	20		
	Физиологическая норма	13	65	20	100
	Пониженная	3	15		
Пульс	Учащенный	20	100	12	60
	Физиологическая норма			8	40
	Уреженный				
	Аритмия				
Дыхание	Учащенное	17	85	4	20
	Физиологическая норма	3	15	16	80
	Уреженное				
Общее состояние животного	Удовлетворительное	9	45	16	80
	Угнетенное	8	40		
	Возбужденное	3	15	4	20
Координация движений	Координированные	9	45		
	Свободные	11	55	20	100
	Атаксия				

Оценка состояния кожных покровов

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
- эластичность	сохранена	1	5	18	90
	понижена	16	80	2	10
	потеряна	3	15		
- цвет	бледно-розовый	7	35	2	10
	розовый			18	90
	серый	2	10		
	анемичный	11	55		
	красный				
	синюшный				
	желтушный				
- влажность	обычная	5	25	20	100
	сухость	15	75		
- характер кожных покровов	равномерно прилегающий	3	15	19	95
	взъерошен	14	70	1	5
	склеен	3	15		
	блестящий	2	10	13	65
	матовый	18	90	7	35

	длинный	2	10	2	10
	короткий	18	90	18	90
	густой	12	60	15	75
	редкий	8	40	5	25
	удерживается хорошо			15	75
	удерживается плохо	8	40		
	удерживается слабо	12	60	3	15
	линька	2	10	2	10
	эластичный	2	10	13	65
	ломкий	1	5		
	облысение	9	45	2	10
- нарушение целостности кожи	ссадины, царапины	7	35	1	5
	язвы				
	пролежни				
	раны	5	25	2	10
	струпы	6	30		
	расчесы	12	60		
	шелушения	14	70	1	5
	болезненность	8	40	1	5
	гиперемия	1	5		
	отеки застойные	1	5		
	отеки воспалительные	1	5		
	эмфизема				
	опухоли	1	5	1	5
- запах	специфический умеренный	6	30	17	85
	специфический резкий	9	45		
	специфический слабый	5	25	3	15
	запах ацетона				
	уремический				
	гнилостный				
- состояние подкожной клетчатки	выражена	5	25	18	90
	слабо выражена	13	65	2	10
	не выражена	2	10		
	n=20				

Оценка состояния лимфатических узлов

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
- величина	не увеличены	6	30	18	90
	увеличены незначительно	7	35	2	10
	увеличены сильно	7	35		
- форма	округлые	19	95	19	95
	плоские	1	5	1	5
	веретенообразные				
- поверхность	гладкие	15	75	20	100
	бугристые	5	25		

- подвижность	подвижные	12	60	20	100
	малоподвижные	8	40		
	неподвижные				
- консистенция	упругая	6	30	20	100
	плотная	13	65		
	мягкая				
	флюктация	1	5		
- температура	без повышения	14	70	20	100
	температуры понижена				
	температура повышена	6	30		
	n=20				

Оценка состояния желудочно-кишечного тракта

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
Аппетит, жажда					
- исследование аппетита	хороший	1	5	14	70
	понижен	12	60		
	отсутствует				
	повышен	5	25	6	30
	извращен	2	10		
- прием корма	свойственный видовой	16	80	20	100
	неправильный	4	20		
- прием воды	свободный	6	30	17	85
	увеличенный (жажда)	11	55	3	15
	уменьшенный	3	15		
	отказ от воды				
- глотание	свободное (не нарушено)	18	90	20	100
	затруднено	2	10		
	болезненно				
	невозможно				
- рвота	разовая	1	5		
	редкая	10	50	2	10
	частая	5	25		
	непрерывная (неукротимая)				
	обильные рвотные массы	1	5		
	умеренные рвотные массы	8	40		
	незначительные рвотные массы	6	30	2	10
	густые рвотные массы	1	5		
	жидкие рвотные массы	6	30	2	10
	запах принятого корма	7	35	1	5
	запах кислый	11	55	1	510
	запах гнилостный	1	5		

	запах фекальный				
	запах мочи				
	примеси (слизь, желчь и т.д.)	6	30	2	10
Живот					
- форма	округлая	6	30	17	85
	бочкообразная	3	15	1	5
	подтянутая	11	55	2	10
- объем	не увеличен	9	45	17	85
	увеличен	2	10	1	5
	уменьшен	9	45	2	10
- чувствительность и напряженность брюшной стенки	болезненная	16	80	2	10
	безболезненная	4	20	18	90
	напряженная	16	80	2	10
	мягкая	4	20	18	90
	наличие копростазов				
	инвагинация				
	наличие инородных тел				
	свободная жидкость в бр. полости	2	10		
- симметричность	симметричный	19	95	20	100
	несимметричный	1	5		
- характер перистальтических шумов	плеск				
	трение брюшины				
	урчание	14	70	2	10
	короткие	2	10		
	редкие	1	5		
	журчащие	16	80	2	10
	звонящие				
	переливающиеся	19	95	20	100
	глухие	1	5		
	грубые	8	40		
	периодические	20	100	20	100
	звонящие с метал. оттенком				
Желудок					
область желудка	болезненная	15	75	1	5
	безболезненная	5	25	19	95
Кишечник					
- перистальтические шумы	умеренные	8	40	18	90
	неравномерные	5	25		
	переливающиеся	17	85	20	100
	булькающие	10	50		
	усиленные	7	35	2	10
	ослабленные	1	5		
- степень наполнения	умеренно	13	65	20	100
	переполнен	3	15		
	пустой	4	20		
- характер содержимого	плотной консистенции	1	5	20	100
	флюктуация	14	70		

	газы	5	25		
- инородные тела	есть				
	отсутствуют	20	100	20	100
- болезненность	есть	18	90	1	5
	отсутствует	2	10	19	95
Печень					
- границы	увеличена (край закругленный)	8	40	1	5
	не увеличена (край острый)	12	60	19	95
- поверхность печени	гладкая	19	95	20	100
	бугристая	1	5		
- консистенция	упругая	16	80	19	95
	тестоватая	2	10		
	плотная	2	10	1	5
	твердая				
- болезненность	есть	15	75	1	5
	отсутствует	5	25	19	95
Дефекация					
- частота дефекации	нормальная	3	15	18	90
	частая	17	85	2	10
	отсутствует				
- поза животного	естественная	9	45	20	100
	неестественная				
	натуживание	10	50		
	жиление	1	5		
- акт дефекации	свободный	8	40	20	100
	затрудненный	3	15		
	напряженный (тенезмы)	9	45		
	болезненный	2	10		
	непроизвольное выдавливание кала				
	ложные позывы	6	30		
	профузный понос				
- количество кала	умеренное	8	40	18	90
	большое	6	30	1	5
	малое	6	30	1	5
- форма кала	специфическая (колбаски)			18	90
	оформлен	1	5	2	10
	не оформлен	19	95		
- цвет кала	темно-коричневый	14	70	19	95
	темно-бурый	4	20	1	5
	буро-зеленый	1	5		
	дегтеобразный				
	серый	1	5		
	торфяной				
	глинисто-желтый				
	серо-глинистый (ахоличный)				

	серо-белый				
- запах кала	специфический	1	5	19	95
	специфический резкий	9	45	1	5
	кислый	1	5		
	зловонный	9	45		
	гнилостный				
- переваримость корма	хорошая			17	85
	удовлетворительная	5	25	3	15
	плохая	15	75		
- примеси	пузырьки газов (пенистый)	7	35		
	слизь	19	95	3	15
	пленки	3	15		
	песок, глина	1	5		
	шерсть	9	45	2	10
	кровь (алая, темная, дегтеобразная)	1	5		
	паразиты	5	25		
	n=20				

Оценка динамики гематологических показателей

Наименование показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
	гол.	%	гол.	%
Лейкоцитоз	11	55	1	5
Эритроцитопения	5	25		
Снижение уровня гемоглобина	5	25		
Снижение гематокрита	5	25		
Сегментоядерный нейтрофилез	6	30	1	5
Лимфоцитоз	5	25		
Моноцитоз	3	15		
Повышение СОЭ	12	60	1	5

Оценка динамики копрологических показателей

Наименование показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
	гол.	%	гол.	%
Изменение цвета кала	20	100	1	5
Изменение запаха кала	20	100	1	5
Изменение консистенции кала	20	100	2	10
Изменение формы кала	20	100	2	10
Видимые примеси кала	20	100	3	15
Изменение pH среды	1	5		
Положительная реакция на скрытую кровь	17	85		
Положительная реакция на билирубин	15	75	1	5
Крахмал внеклеточный	20	100	1	5
Растит. клетчатка непереваримая	10	50		
Мышечные волокна без и с исчерч.	18	90	1	5

Кишечный эпителий	11	55	1	5
Лейкоциты	20	100	1	5
Эритроциты	19	95		
Соединительная ткань	12	60	1	5
Слизь	20	100	1	5
Йодофильная флора	12	60	1	5
Дрожжевые грибы	19	95	1	5
Кристаллы	13	65	1	5

Оценка динамики показателей ультразвукового исследований печени

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
границы печени	расширены	8	40	1	5
	не расширены	12	60	19	95
контуры	ровные	20	100	20	100
	неровные				
диафрагмальный контур	четкий	20	100	20	100
	нечеткий				
эхоструктура	изоэхогенная	12	60	19	95
	однородная				
	гипоэхогенная				
	гиперэхогенная	8	40	1	5
рисунок зернистости	четкий	11	55	19	95
	сглаженный	9	45	1	5
внутрипеченочные желчные протоки	не расширены свободны	17	85	19	95
	расширены	3	15	1	5
общий желчный проток	стенки не утолщены, просвет свободный	12	60	19	95
	стенки утолщены	8	40	1	5
	n=20				

Оценка динамики показателей ультразвукового исследований кишечника

Наименование показателей	Характеристика показателей	Первичный прием		Вторичный прием	
		гол.	%	гол.	%
Двенадцатиперстная кишка					
наполнение	умерено	13	65	20	100
	переполнена	3	15		
	слабо наполнена	4	20		
дифференциация слоев	сохранена	13	65	20	100
	сглажена	7	35		
	утрачена				
перистальтика	ослаблена	1	5		
	усилена	7	35	2	10
	умеренная	12	60	18	90
	отсутствует				

Тощая кишка					
наполнение	умерено	13	65	20	100
	переполнена	3	15		
	слабо наполнена	4	20		
дифференциация слоев	сохранена	13	65	20	100
	сглажена	7	35		
	утрачена				
перистальтика	ослаблена	1	5		
	усилена	7	35	2	10
	умеренная	12	60	18	90
	отсутствует				
Подвздошная кишка					
наполнение	умерено	13	65	20	100
	переполнена	3	15		
	слабо наполнена	4	20		
дифференциация слоев	сохранена	15	75	20	100
	сглажена	5	25		
	утрачена				
перистальтика	ослаблена	1	5		
	усилена	7	35	2	10
	умеренная	12	60	18	90
	отсутствует				
Толстый кишечник					
наполнение	умерено	13	65	20	100
	переполнен	3	15		
	слабо наполнен	4	20		
дифференциация слоев	сохранена	13	65	20	100
	сглажена	7	35		
	утрачена				
перистальтика	ослаблена	1	5		
	усилена	7	35	2	10
	умеренная	12	60	18	90
	отсутствует				
	n=20				

Заключение:

1.1. В ходе первичного приема обследуемых животных (собаки в возрасте 1 – 15 лет) установлены значительные отклонения в функционировании желудочно-кишечного тракта, состоянии кожных покровов, видимых слизистых оболочек, гематологических показателей (выраженный лейкоцитоз (55%), эритроцитопения (25%), сегментоядерный нейтрофилез (30%)); лабораторно подтверждены весоые нарушения пищеварения (обнаружение крахмала (до 100%), непереваримой клетчатки (50%), мышечных волокон (до 90%), клеток крови (до 100%), слизи (100%), микрофлоры и дрожжевых грибов (до 95%)). В сочетании с лекарственной терапией острых расстройств пищеварения, истощения, в реабилитационный период назначена

ветеринарная диета с введением в рацион сухого полнорационного диетического корма для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления).

1.2. Установлено улучшение физиологического состояния животных, восстановление желудочно-кишечного тракта и функции пищеварения в течение 14-35 дней после проведенной терапии и перевода животных на кормление сухим полнорационным диетическим кормом для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления).

1.3. Сухой полнорационный диетический корм для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления) оказывает выраженное позитивное влияние на пищеварительную систему, набор массы тела; положительная динамика гастроинтестинальных симптомов, гематологических и копрологических показателей, состояния кожных покровов, слизистых оболочек подтверждает улучшение функции пищеварения. Восстанавливаются копрологические показатели, прекращается рвота, нормализуется консистенция кала, отсутствуют частицы непереваренного корма, запах кала становится характерным, видовым, уменьшаются и исчезают примеси слизи и крови, количество кала приходит в границы физиологической нормы.

1.4. Переносимость сухого полнорационного диетического корма для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления) высокая.

1.5. Пищевая непереносимость сухого полнорационного диетического корма для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления) не зарегистрирована.

1.6. Аллергические реакции на введенный в рацион сухой полнорационной диетический корм для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления) не зарегистрированы.

1.7. Сухой полнорационный диетический корм для взрослых собак всех пород и рекомендованный при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении AlphaPet Vet Diet (по нормам кормления) может быть рекомендован при острых расстройствах пищеварения, в реабилитационный период и при истощении у взрослых собак.