

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Кубатола® Пикс Аэрозоля для лечения заболеваний
кожи, когтей и копыт у животных

(Организация-разработчик: АО «Авефлор», 507 32 Копидлно, Будцевес 26, Чешская
Республика/«AVEFLOR a.s.», Budceves 26, 507 32, Kopidlno, Czech Republic)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кубатол® Пикс Аэрозоль
(Kubatol Pix Spray).

Международное непатентованное название: деготь.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Кубатол® Пикс Аэрозоль в 100 г в качестве действующего вещества содержит буровый деготь – 4,6 г и вспомогательные вещества: этилацетат, акриловый сополимер, денатурированный этанол 96%, диметил эфир.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от желто-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом дегтя.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 150 мл в металлические флаконы под давлением с пластиковым распылительным вентилем и пластиковым колпачком. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Кубатол® Пикс Аэрозоль в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 10 до 25 °C.

6. Кубатол® Пикс Аэрозоль следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Кубатол® Пикс Аэрозоль относится к дерматотропным и антисептическим лекарственным препаратам.

10. Буровый деготь, входящий в состав лекарственного препарата, получен методом сухой перегонки древесины, состоит из биологически активных химических соединений, обладает противовоспалительным, бактериостатическим, антимикотическим свойствами. При нанесении на пораженную область практически не проникает через эпидермис и не попадает в органы и ткани. Оказывает кератолитическое и кератопластическое действие, усиливает процесс ороговения, подсушивает и ускоряет заживление ран.

Кубатол® Пикс Аэрозоль образует на месте применения плотную полимерную эластичную пленку, предотвращающую повторную бактериальную контаминацию и негативное влияние окружающей среды, обеспечивая механическую защиту. Пленка обладает «дышащим эффектом» (хорошо пропускает воздух). При применении лекарственного препарата в области кожных складок и изгибов защитная пленка не трескается.

Кубатол® Пикс Аэрозоль по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

III. Порядок применения

11. Кубатол® Пикс Аэрозоль применяют сельскохозяйственным и мелким домашним животным (за исключением кошек) при различных поражениях кожи, таких как ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны, а также заболеваниях когтей (поверхностный панариций и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.).

12. Противопоказанием для применения Кубатол® Пикс Аэрозоль является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Запрещается применять Кубатол® Пикс Аэрозоль кошкам, а также наносить на сильно кровоточащие, мокнущие и открытые раны.

13. Перед нанесением препарата рекомендуется очистить обрабатываемую поверхность от гноя, раневого экссудата, некротизированных тканей, удалить шерсть.

Кубатол® Пикс Аэрозоль распыляют на пораженный участок в течение 1 – 2 секунд, держа флакон вертикально на расстоянии 15 – 20 см от обрабатываемой поверхности. После нанесения препарата на пораженном участке образуется пленка, когда пленка подсохнет, препарат наносят повторно в 2 – 3 слоя. Продолжительность лечения составляет от 3 до 8 дней в зависимости от тяжести поражения и скорости заживления обрабатываемой поверхности.

Обработку животных следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание лекарственного препарата в глаза.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особеностей действия при первом приеме препарата и его отмене не выявлено.

16. Особеностей применения у беременных животных, у животных в период лактации, у потомства не выявлено.

17. При пропуске одной или нескольких обработок препаратом Кубатол® Пикс Аэрозоль применение его следует продолжить в соответствии с настоящей инструкцией.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Кубатол® Пикс Аэрозоль в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует. Не рекомендуется применение препарата Кубатол® Пикс Аэрозоль с другими средствами для наружного применения.

20. Мясо и молоко продуктивных животных в период и после применения Кубатол® Пикс Аэрозоля разрешается использовать в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Кубатол® Пикс Аэрозоль следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Кубатол® Пикс Аэрозоль. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

АО «Авефлор», 507 32 Копидлно, Будцевес 26, Чешская Республика / «AVEFLOR a.s.», Budceves 26, 507 32, Kopidlno, Czech Republic.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО «Авефлор», 507 32 Копидлно, Будцевес 26, Чешская Республика / «AVEFLOR a.s.», Budceves 26, 507 32, Kopidlno, Czech Republic.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению лекарственного препарата Кубатол® Пикс Аэрозоль, утвержденная Россельхознадзором 02 марта 2015 года.

Номер регистрационного удостоверения

203-3-1.15-2524 N 17361-3-11.9/03029