

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению препарата Адвантейдж[®] для лечения и профилактики энтомозов у собак, кошек и декоративных кроликов

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

Номер регистрационного удостоверения:

276-3-2.18-4046 ЗТВУ-3-0.2/01184

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Адвантейдж[®] (Advantage[®]).

Международное непатентованное наименование: имидаклоприд.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Адвантейдж[®] в 1 мл в качестве действующего вещества содержит имидаклоприд — 100 мг, а также вспомогательные вещества: бензиловый спирт, пропилен карбонат и бутилгидрокситолуол.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения — 5 лет со дня производства.

Запрещается применение препарата Адвантейдж[®] по истечении срока годности.

4. Адвантейдж[®] выпускают в форме раствора (spot-on), расфасованным по 0,4; 0,8; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, упакованные по 1 и 4 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Адвантейдж[®] в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Адвантейдж[®] следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Адвантейдж[®] относится к инсектицидным препаратам группы хлороникотиниловых инсектицидов.

10. Имидаклоприд {1-(6- хлор-3-пиредилметил) - N-нитро-имидазолидин-2}, входящий в состав препарата, обладает выраженным инсектицидным и ларвицидным действием на блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках и кошках.

Механизм действия имидаклоприда основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что вызывает гибель насекомых.

После нанесения препарата на кожу имидаклоприд постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах животного, оказывая длительное (до 4-х недель) контактное инсектицидное действие.

Адвантейдж[®] по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и sensibilizing действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

III. Порядок применения

11. Адвантейдж[®] применяют для уничтожения насекомых (блох, вшей, власоедов), паразитирующих на собаках, кошках и декоративных кроликах.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Адвантейдж[®] не разрешается применять щенкам моложе 8-недельного возраста, а также котят и декоративным кроликам моложе 10-недельного возраста.

13. При работе с препаратом Адвантейдж[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

14. Обработку беременных и кормящих самок при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

15. Адвантейдж[®] применяют животным однократно путем капельного («spot-on») нанесения на сухую, неповрежденную кожу. Перед использованием с пипетки снимают защитный колпачок и, расположив ее вертикально, прокалывают защитную мембрану носика пипетки (надев колпачок с обратной сторо-

ны), затем колпачок снова снимают. Препарат, раздвинув шерсть, наносят животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи.

В зависимости от вида и массы животного используют Адвантейдж® различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Вид и масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза имидаклоприда, мг/кг массы животного
Собаки:		
до 4 кг	0,4	10
4 - 10 кг	1,0	10 - 25
10 - 25 кг	2,5	10 - 25
25 - 40 кг	4,0	10 - 16
Кошки:		
до 4 кг	0,4	10
4 - 8 кг	0,8	10 - 20
Декоративные кролики:		
до 4 кг	0,4	10
4 - 8 кг	0,8	10 - 20

При обработке собак массой более 40 кг, кошек и декоративных кроликов массой более 8 кг используют комбинации пипеток различной фасовки из расчета 0,1 мл/кг.

При обработке крупных собак содержимое пипетки наносят на кожу в 3 – 4 места вдоль спины, от холки до хвоста.

Гибель паразитирующих на животном насекомых происходит в течение 12 часов. Защитное действие препарата после однократной обработки животного продолжается до 4 недель. Повторные обработки животных на протяжении сезона активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в 28 дней.

При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения препарата у животных возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1-4 дней и не требуют применения лекарственных средств. Слизывание препарата может вызвать повышенную саливацию у животного, так как препарат имеет горький вкус, что не является признаком отравления и самопроизвольно проходит через

несколько минут. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у некоторых животных может наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Не следует применять Адвантейдж® одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности.

21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным. Запрещается применение препарата Адвантейдж® кроликам, мясо которых предназначено в пищу людям.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «БАЙЕР»
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул.,
18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Адвантейдж®, утвержденная Россельхознадзором 22.09.2016 года.