

**Pchelodar<sup>®</sup>**  
professional

# ВетСпокоин

## Инструкция

по ветеринарному применению препарата ВетСпокоин.  
Успокаивающее, противорвотное средство, предотвращающее  
укачивание инормализующее психогенные нарушения в поведении  
собак и кошек.

(Организация-производитель - ЗАО «Агробиопром», Россия).

## Общие сведения

**Регистрационный номер:** РК-ВП-4-2193-13

**Международное непатентованное наименование:** аминоксалиновая кислота, прометазин, трава пустырника, валерианы лекарственной экстракт, маточное молочко.

## Состав и форма выпуска

ВетСпокоин (VetSpokoin) содержит в одной таблетке действующие вещества: фенибут – 36 мг, экстракт валерианы – 10 мг, экстракт пустырника – 8 мг, прометазин – 4 мг, экстракт пчелиного маточного молочка – 1 мг и вспомогательные компоненты: лактоза, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, поливинилпирролидон, картофельный крахмал. По внешнему виду препарат ВетСпокоин представляет собой таблетки белого цвета. Выпускают препарат расфасованным по 15 таблеток в полимерные флаконы, герметично укупоренные навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон упакован в картонную пачку в комплекте с инструкцией по применению.

## Лекарственная форма

Таблетки для внутреннего применения.

## Фармакотерапевтическая группа

Комбинированное седативное лекарственное средство.

## Фармакологические свойства

### Фармакодинамика

Активные действующие вещества препарата ВетСпокоин обладают мягким седативным, спазмолитическим, анксиолитическим (ослабляющим чувство страха), стресспротекторным, адаптогенным и болеутоляющим действием. Антиоксиданты, входящие в состав препарата, предупреждают развитие стресса и укрепляют иммунную систему животного. Фенибут облегчает ГАМК-опосредованную передачу нервных импульсов в ЦНС, оказывает психостимулирующее, антиагрегантное и антиоксидантное действие. Улучшает функциональное состояние мозга за счет нормализации метаболизма тканей и влияния на мозговое кровообращение. Способствует снижению или устранению чувства тревоги, напряженности, беспокойства и страха, нормализует сон, оказывает некоторое противосудорожное действие. Прометазин является антигистаминным, противорвотным, противозудным, снотворным и местноанестезирующим средством. Угнетает ЦНС, оказывает седативное, анксиолитическое, антипсихотическое и снотворное действие. Уменьшает возбудимость вестибулярных рецепторов, угнетает функцию лабиринта, устраняет головокружение у животных. Противорвотный эффект обусловлен блокадой рецепторов хеморецепторной зоны продолговатого мозга. Экстракт пустырника оказывает седативное, успокаивающее, гипотензивное и кардиотоническое действие, которое обусловлено свойствами биологически активных веществ, содержащихся в растении (в т.ч. гликозидов, алкалоидов, флавоноидов, сапонинов). Экстракт валерианы оказывает спазмолитическое и седативное действие, уменьшает возбудимость ЦНС, снижает тонус гладких мышц. Комплекс биологически активных веществ валерианы воздействует через нейрогуморальные механизмы и влияет на проводящую систему миокарда, а также регулирует сердечно-сосудистую деятельность, замедляя ритм сердца и незначительно расширяя коронарные сосуды. Пчелиное маточное молочко оказывает адаптогенное, кардиопротекторное, иммуностимулирующее действие, а также улучшает состояние центральной и периферической нервной системы, повышает усвоение глюкозы и кислорода головным мозгом.

### Фармакокинетика

Абсорбция высокая, хорошо проникает во все ткани организма и через гематоэнцефалический барьер. Равномерно распределяется в печени и почках. Метаболизируется в печени – 80-95%.

Около 5% выводится почками в неизменном виде, частично - с желчью.

ВетСпокоин по степени воздействия на организм теплокровных животных относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

В рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического, кумулятивного, эмбриотоксического, тератогенного и алергизирующего действия.

### Показания к применению

ВетСпокоин назначают собакам для коррекции нежелательного поведения – чувство страха, повышенное и половое возбуждение, различные фобии, крики животных во время половой охоты, навязчивое вылизывание, беспричинный лай, мечение в квартире, чрезмерное беспокойство при ложной щенности, имитация покрытия. Для профилактики стресса, для купирования симптомов укачивания (рвота и саливация) животного в авто- и авиатранспорте.

## Порядок применения

ВетСпокоин применяют перорально (внутри), индивидуально, в дозе **1 таблетка на 10 кг** массы животного с небольшим количеством корма или принудительно задают на корень языка или в защечную область. ВетСпокоин принимают 2 раза в сутки в течение 10-15 дней в зависимости от индивидуальных особенностей организма и характера поведения животного, но не более 3 недель. С целью профилактики стресса при проведении различных мероприятий (выставка, авто- и авиатранспортировка, диагностические исследования, груминг, приход гостей, новая обстановка и др.), препарат назначают за 2-3 дня до события. Для профилактики укачивания и как противорвотное средство назначают однократно за 1-2 часа до транспортировки. Для снижения половой активности (чрезмерная вокализация, мечение, беспокойство и агрессия) препарат рекомендуется применять одновременно с гормональными контрацептивными средствами для животных. Продолжительность курса приема устанавливает ветеринарный врач индивидуально для каждого животного. При пропуске одного или нескольких приемов средства его применение возобновляют в тех же дозах и по той же схеме. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме и отмене не установлены.

### Побочные явления и осложнения

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдаются. При индивидуальной непереносимости компонентов препарата и проявлении аллергических реакций, применение препарата следует прекратить.

### Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не следует применять беременным и лактирующим самкам, а также при заболеваниях мочеполовой системы и диабете.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведений о взаимодействии препарата ВетСпокоин с другими средствами неизвестно.

### Передозировка

Симптомы передозировки у животных не выявлены.

### Особые указания

Возможность применения лекарственного препарата у потомства животных не установлена.

### Меры личной профилактики

При работе с ВетСпокоином следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам ВетСпокоина следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата внутрь необходимо обратиться в медицинское учреждение. Пустые флаконы из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Не использовать для бытовых целей пустые флаконы. Применять препарат только по назначению.


### Условия хранения

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 25°C. Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца от даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.



1 таблетка = 1 доза

Производитель: ЗАО «Агробιοпром», РФ  
тел./факс: +7 (495) 607-50-34,+7 (495) 607-67-81.  
Адрес производства: РФ, Московская обл., г. Балашиха,  
Полтовское шоссе, владение 4

[www.agrobioprom.com](http://www.agrobioprom.com)



**Agrobioprom**  
ветеринарные препараты